




3.1.1 Hospitalisations

Fig. 3.1.1 Taux d'hospitalisations, toutes causes, par groupe d'âge et sexe, Canada, 2009-2010



| Âge | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tous | 17 064 | 4 212 | 1 906 | 1 868 | 3 563 |
| Garçons | 19 298 | 4 633 | 2 073 | 1 922 | 2 634 |
| Filles | 14 725 | 3 769 | 1 728 | 1 811 | 4 538 |

Remarque : les chiffres présentés ici excluent les nouveau-nés nés dans les établissements sondés et certains étant nés hors des établissements mais admis dans les 24 heures suivant leur naissance.

Adaptation issue de la Base de données sur les congés des patients (BDGP) de l'Institut canadien d'information sur la santé. <http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/internet/EN/Home/home/cihi000001>; consultée le 10 juillet 2012.

En 2009-2010, les nourrissons constituaient, et de loin, le groupe présentant le taux d'hospitalisations le plus élevé parmi tous les autres groupes. Les nourrissons obtenaient leur congé d'hôpital à un taux de 17 064/100 000, soit un taux au moins quatre fois plus élevé que celui de tous les autres groupes. Et parmi les nourrissons, les garçons ont été hospitalisés 1,3 fois plus que les filles.

