




#### 3.3.7 Blessures non intentionnelles

**Fig. 3.3.7 Taux de décès par blessures non intentionnelles, par groupe d'âge et sexe, Canada, 2009**



Adaptation issue de la base de données CANSIM de Statistique Canada (<http://cansim2.statcan.gc.ca>), tableau no 102-0540; consulté le 10 juillet 2012.

Au Canada, les blessures non intentionnelles continuent d'être la principale cause de décès des enfants et jeunes de plus de 1 an. Le taux le plus élevé de décès par blessures non intentionnelles est celui des 15 à 19 ans; en 2009, 360 jeunes âgés de 15 à 19 ans sont décédés des suites d'une blessure non intentionnelle (16,0/100 000), tandis que ce taux se chiffre à 7,9/100 000 chez les nourrissons.

#### Conséquences

Dès un jeune âge, les garçons subissent plus fréquemment des blessures non intentionnelles graves par rapport aux filles;<sup>1</sup> en effet, le taux de décès par blessures non intentionnelles chez les adolescents masculins est presque deux fois et demie plus élevé que chez les filles du même groupe d'âge.

<sup>1</sup> Instituts de recherche en santé du Canada (2005). Le genre et la santé. Consulté le 28 mai 2012, à [http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/documents/gender\\_health\\_mpkkit\\_2005\\_f.pdf](http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/documents/gender_health_mpkkit_2005_f.pdf).

