




3.5.11 Décès chez les nourrissons

Fig. 3.5.11 Taux de mortalité chez les nourrissons, Canada, provinces et territoires, 2009



Adaptation issue de la base de données CANSIM de Statistique Canada (<http://cansim2.statcan.gc.ca>), tableau no 102-0507; consulté le 10 juillet 2012.

En 2009, 1 911 nourrissons sont décédés au Canada, ce qui représente un taux de mortalité de 4,9/1 000. La tendance était plutôt stable en 1999 (taux de 5,3/1 000) par rapport à 2009.¹ En 2009, les taux de mortalité chez les nourrissons les plus élevés au pays étaient ceux des Territoires du Nord-Ouest (15,5/1 000), du Nunavut (14,8/1 000) et du Yukon (7,8/1 000), tandis que ceux de l'Île-du-Prince-Édouard (3,4/1 000), de la Nouvelle-Écosse (3,4/1 000) et de la Colombie-Britannique (3,6/1 000) étaient les plus faibles. En 2009, le taux de mortalité des nourrissons pour tout le Canada entier était 4,9/1 000.

¹ Statistique Canada (2008). Statistique de l'état civil, bases de données sur les naissances et les décès et estimations de la population.

Conséquences

Bien que l'Agence de la santé publique du Canada considère que le taux de mortalité chez les nourrissons canadiens correspond à celui d'autres pays de l'OCDE², certaines populations et collectivités affichent toutefois des taux beaucoup plus élevés que la moyenne canadienne.

² Agence de la santé publique du Canada (2008). Rapport de l'administrateur en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au Canada 2008. Consulté le 29 mai 2012, à <http://www.phac-aspc.gc.ca/cphorsphc-respcacsp/2008/fr-rc/cphorsphc-respcacsp06c-fra.php>.

